ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

INDICACIONES:

- **Cistitis bacteriana.**
- **Disolución de los cálculos de estruvita.**
- **Manejo de las recidivas de urolitiasis por estruvita y oxalato de calcio.**

En perros de edad avanzada se recomienda que se realice una comprobación de la función renal antes de administrar Urinary Canine

CONTRAINDICACIONES:

- **Gestación, lactancia, crecimiento.**
- **Insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica.**
- **Insuficiencia cardíaca.**
- **Utilización de medicamentos acidificantes de la orina.**
- **Hiperlipidemia.**
- **Pancreatitis o antecedentes de episodios de pancreatitis.**

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Para la disolución de los urolitos de estruvita o eliminación de una infección urinaria se precisa administrar Urinary Canine durante un periodo de 5 a 12 semanas. Para evitar posibles recaídas, Urinary Canine deberá administrarse durante al menos 1 mes más después de haber obtenido un resultado negativo en el cultivo bacteriológico de la orina.

- Urinary S/O Canine ayuda a disolver eficazmente los cálculos de estruvita. Un pH urinario acidificado es poco favorable para el desarrollo de bacterias, que suelen estar asociada a los cálculos de estruvita.

- La orina no saturada crea un entorno donde no pueden proliferar los cálculos. De este modo se evita el desarrollo de cálculos de estruvita y oxalato.

- La dilución urinaria disminuye la concentración de cálculos de estruvita y oxalato. Un mayor volumen urinario también contribuye al mantenimiento de la vejiga.

- El magnesio es un componente de los cálculos de estruvita (urolitos de fosfato amonicomagnésico).

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Un aumento moderado del contenido en sodio provoca la **dilución** de la orina y junto a la **acidificación** de la misma garantiza una eficaz prevención de los cálculos de estruvita, creando además un entorno desfavorable para la formación de los cálculos de oxalato cálcico.
Urinary Canine está indicado en el tratamiento primario de los cálculos antes de la identificación de los mismos.

URINARY S/O LP 18

CANINE

ANÁLISIS MEDIO:

Proteínas:	18 %
Grasas:	17 %
Carbohidratos:	44.8 %
ELN:	48.3 %
Fibras alimentarias:	5.7 %
Celulosa bruta:	2.2 %
Energía metabolizable (C)*:	4 182 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**:	4 055 kcal/kg
Omega 6:	3.46 %
Omega 3:	0.54 %
EPA+DHA:	0.21 %
Calcio:	0.5 %
Fósforo:	0.5 %
Sodio:	1.2 %
Selenio:	0.11 mg/kg
Magnesio:	0.05 %
Cloro:	2.20 %

Complejo antioxidante sinérgico:	
Vitamina E:	**600 mg/kg**
Vitamina C:	**200 mg/kg**
Taurina:	**2 100 mg/kg**
Luteína:	**5 mg/kg**

* Según la ecuación de ATWATER

** Energía medida en el Centro de Investigación Royal Canin

Envases de 2, 7.5 y 14 kg

Tamaño real

INGREDIENTES:

Arroz, harina de maíz, grasas animales, carne de ave deshidratada, gluten de maíz, minerales, proteínas animales hidrolizadas, fibras vegetales, huevo deshidratado, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, L-lisina, taurina, extracto de rosa de la India (fuente de luteína), L-triptófano.

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

Es recomendable fraccionar la ración en 2 comidas.

Peso del perro	delgado		normal		sobrepeso	
	gramos	dosis	gramos	dosis	gramos	dosis
2 kg	65	6/8	55	5/8	40	3/8
4 kg	110	1 2/8	90	1	65	6/8
6 kg	150	1 5/8	120	1 2/8	90	1
8 kg	185	2	150	1 5/8	110	1 2/8
10 kg	220	2 3/8	175	1 7/8	130	1 3/8
15 kg	295	3 2/8	235	2 4/8	175	1 7/8
20 kg	360	3 7/8	290	3 1/8	215	2 3/8
25 kg	425	4 5/8	340	3 5/8	255	2 6/8
30 kg	485	5 2/8	390	4 2/8	290	3 1/8
35 kg	545	5 7/8	435	4 6/8	325	3 4/8
40 kg	600	6 4/8	480	5 2/8	360	3 7/8
50 kg	710	7 5/8	565	6 1/8	425	4 5/8
60 kg	810	8 6/8	645	7	485	5 2/8
70 kg	905	9 6/8	725	7 7/8	545	5 7/8
80 kg	995	10 6/8	800	8 5/8	600	6 4/8

ROYAL CANIN